REVISION 5

Alerte diagnostic
Mettre une alerte sur le choix "diagnostic en attente" quand ce choix n'est pas modifié par le centre après 6 mois

Diagnostics en 3 Dimensions (niveau)
1 choix par niveau. Modification possible directement par la FCMRR / BNA

Outils de suppression des doublons
- sur BNA suppression quand type d'acte et patient identique sur demande ou automatique
- sur DMA suppression possible du patient

Mise en place
Printemps 2016, date à définir

Un diagnostic en 3D







Mr P 73ans

- Consultation pour des oublis : rdv, noms,dates...
- Autonomie conservée

- ATCD : ras

Bilan cognition et comportement

- MMS=27/30 (-1 orientation ; -2 calcul)
- Grober : RT=40/48 ; RD=12/16
- BREF=17/18
- CDA: apathie
- Déficit mémoire épisodique verbale, déficit exécutif (empan, TMT).

Examens complémentaires

- IRM cérébrale : atrophie hippocampique grade II
- Pet scan : hypométabolisme pariéto-temporal interne droit
- PL (protocole IFRAD) : biomarqueurs en faveur d'une MA

Le Stade: Trouble cognitif mineur

Diagnostic syndromique:

Présentation à dominante amnésique

Dimension Etiologique

MA probable avec marqueur biologique